




# SO VỚI

# Bệnh Cúm

Vietnamese

Mất vị giác và khứu giác  
**CỘNG** VỚI sốt, ho, thờ đốc,  
mệt mỏi, đau họng, sổ mũi  
hoặc nghẹt mũi, nhức mỏi  
người, đau đầu.



## CÁC TRIỆU CHỨNG

Sốt, ho, thờ đốc, mệt mỏi,  
đau họng, sổ mũi hoặc nghẹt  
mũi, nhức mỏi người, đau đầu.



Nếu quý vị mắc COVID-19, có thể  
các triệu chứng của quý vị xuất  
hiện chậm hơn là bệnh cúm.



## KHỞI PHÁT



Đối với cả COVID-19 và  
bệnh cúm, quý vị có thể mắc  
bệnh nhưng phải sau 1+ ngày  
mới bắt đầu xuất hiện  
triệu chứng.

Đối với một số nhóm  
dân số và nhóm tuổi,  
COVID-19 dễ lây lan  
hơn là bệnh cúm.



## LÂY LAN



Cả COVID-19 và bệnh cúm đều  
có thể lây lan từ người sang  
người giữa những người tiếp  
xúc gần với nhau (trong phạm  
vi 6 feet). Cả hai đều lây lan  
chủ yếu qua các hạt nước nhỏ  
li ti bắn ra khi người mắc bệnh  
ho, hắt hơi, hoặc nói chuyện.

Cả COVID-19 và bệnh cúm đều  
có thể gây bệnh nặng và các  
biến chứng nghiêm trọng.  
Những người có nguy cơ cao  
nhất là người cao niên, người  
mắc một số chứng bệnh  
tiềm ẩn, và đang mang thai.



## NGUY CƠ



Nguy cơ gặp biến  
chứng đối với trẻ  
em khỏe mạnh mắc  
bệnh cúm là cao  
hơn so với  
COVID-19.



## ĐIỀU TRỊ



Hiện có vắc-xin ngừa cúm hàng năm để phòng ngừa  
căn bệnh này. Hiện không có vắc-xin ngừa COVID-19.

Bệnh cúm có một loại thuốc kháng vi-rút có thể làm  
giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và độ dài thời  
gian mắc bệnh nếu được kê toa đúng trong vòng 48  
giờ đồng hồ kể từ khi khởi phát triệu chứng.